

НЕСУШКИ
РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ



ЛОМАНН ЛСЛ -КЛАССИК

ПРОДУКТЫ ЛОМАНН ТИРЦУХТ

- **ЛОМАНН ЛСЛ-КЛАССИК**
- **ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК**
- **ЛОМАНН ЛСЛ-ЛАЙТ**
- **ЛОМАНН БРАУН-ЛАЙТ**
- **ЛОМАНН ЛСЛ-ЭКСТРА**
- **ЛОМАНН ТРАДИЦИЯ**
- **ЛОМАНН СЭНДИ**
- **ЛОМАНН СИЛВЕР**

Растущая во всем мире концентрация и возрастающая конкуренция в промышленном птицеводстве требуют производительных несушек для выполнения требований рынка.

Ломанн Тирцухт предлагает широкий выбор высококачественных несушек "сделано в Германии" для того, чтобы отвечать этому спросу.

Важнейшими продуктами являются **ЛОМАНН ЛСЛ-КЛАССИК** и **ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК** известные за их продуктивность в производстве высококачественных белых и коричневых яиц.

ЛОМАНН ЛСЛ-ЛАЙТ и **ЛОМАНН БРАУН-ЛАЙТ** являются двумя новыми продуктами, выведенными для рынков, предпочитающих малый вес яйца и низкие затраты корма на яйцо.

Для рынков, требующих высокий вес яйца, идеальная белая несушка - **ЛОМАНН ЛСЛ-ЭКСТРА**.

ЛОМАНН ТРАДИЦИЯ - новая коричневая несушка с быстрым ростом веса яйца, особенно приспособлена для альтернативных систем содержания.

ЛОМАНН СЭНДИ - несушка с белым оперением для производства яиц кремового цвета. Отличается очень хорошей конверсией корма.

У **ЛОМАНН СИЛВЕР** речь идет об окрашенной преимущественно в белый цвет несушке для производства равномерно коричневых яиц с низким весом. Особенное преимущество - превосходное оперение.

ЛОМАНН ЛСЛ несушки пригодны не только для клеточного содержания, они также подходят другим системам без обрезания клюва.

Интенсивное обслуживание всех ферм и инкубаторов собственной ветлабораторией гарантирует самый высокий статус здоровья поставляемых от Ломанн Тирцухт цыплят.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Высокая продуктивность при целенаправленной селекции	2 – 3
Данные продуктивности	3
Кривая роста	4
Схема селекции	5
Живая масса, потребление корма	6
Кормление	7 – 14
Общие рекомендации	15
Размещение цыплят	15 – 16
Напольное содержание	16 – 17
Микроклимат птичника	18
Освещение	18 – 22
Гигиена	22
Показатели продуктивности	23 – 24
Весовые категории яйца	25
Кривая продуктивности	26
Дебикирование	26 – 27
Вакцинация	27 – 28

ВВЕДЕНИЕ

Почему вам необходимо уделить время данному руководству?

Держатель несушек и специалисты коммерческого производства яйца нуждаются сегодня в основных знаниях по различным специальным областям: генетика, психология, ветеринария, кормление, способ содержания, качество яйца, сбыт...

Тот, кто хочет иметь успех выше среднего, должен постоянно быть в курсе положения дел на своей птицефабрике и располагать информацией о теоретически возможных путях улучшения.

Мы надеемся, что данное руководство поможет вхождению в работу новому сотруднику и даст также опытному практику дополнительные сведения в отношении того, как можно повысить яйценоскость и/или благополучие несушек.

РЕКОРДНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ



В последние годы передовые методы значительно улучшили племенное качество.

Благодаря развитию мощных электронных систем обработки данных, стало возможным систематически применять на практике теорию селекции - таким образом претворять в жизнь современную количественную генетику.

На фирме ЛОМАНН ТИРЦУХТ давно начали применение этих новых методов и поэтому фирма может предложить большой практический опыт и ноу-хау. Группа высококвалифицированных специалистов гарантирует незамедлительное использование последних исследовательских достижений на практике. На меняющиеся потребности рынка реагирует быстро и эффективно.

Более того, в национальном и международном масштабе ЛОМАНН ТИРЦУХТ классифицируется как перворазрядная фирма по вопросам здоровья птицы, что является одним из самых решающих факторов продуктивности и прибыльности. Высокое качество продуктов фирмы обеспечено интенсивной исследовательской работой нашей ветеринарной лаборатории, увеличением резистентности к заболеваниям путем применения генетических средств и соблюдением строжайших гигиенических условий. Кроме того, фирма имеет знания и опыт по всем вопросам кормления.

Практика во всех сферах птицеводства выигрывает от этого экстенсивного опыта: яйцо птицы ЛОМАНН ТИРЦУХТ имеет наивысшее качество и реализуется по доходным ценам. Это

подтверждено результатами опытов по сравнению продуктивности, проводимых в полевых условиях и в независимых институтах. Племенные продукты ЛОМАНН ТИРЦУХТ часто становятся победителями и они в числе наилучших известны во всем мире.

ЛОМАНН ТИРЦУХТ - нужный партнер для прогрессивного, успешного птицеводства.




ДАННЫЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

Яйценоскость	возраст при 50 % продуктивности	145 - 150 дней
	пик продуктивности	92 - 95 %
	Число яиц на НН	
	за 12 месяцев яичной прод-ти	315 - 320
	за 14 месяцев яичной прод-ти	355 - 365
	Яйцемасса на НН	
за 12 месяцев яичной прод-ти	19.5 - 20.5 кг	
за 14 месяцев яичной прод-ти	22.0 - 23.0 кг	
Средняя масса яйца	за 12 месяцев яичной прод-ти	62.0 - 63.0 г
	за 14 месяцев яичной прод-ти	62.5 - 63.5 г
Характеристика яйца	цвет скорлупы	привлекательно белый
	прочность скорлупы	> 40 Н
Потребление корма	1. - 20. недели	7.0 - 7.5 кг
	продуктивный период	105 - 115 г/день
	конверсия корма	2.0 - 2.1 кг/кг яйцемассы
Живая масса	на 20 неделе	1.3 - 1.4 кг
	в конце продуктивного периода	1.7 - 1.9 кг
Сохранность	выращивание	97 - 98 %
	яйценоский период	94 - 96 %

КРИВАЯ РОСТА


Развитие живой массы несушек ЛОМАНН ЛСЛ - КЛАССИК



LSL 901

возраст нед.	диапазон веса г	возраст нед.	диапазон веса г	возраст нед.	диапазон веса г	возраст нед.	диапазон веса г
1	72 - 78	15	1077 - 1167	29	1622 - 1758	54	1687 - 1828
2	120 - 130	16	1120 - 1214	30	1632 - 1768	56	1690 - 1830
3	180 - 194	17	1166 - 1262	31	1637 - 1773	58	1692 - 1833
4	247 - 267	18	1213 - 1315	32	1642 - 1778	60	1694 - 1836
5	324 - 350	19	1269 - 1375	34	1646 - 1784	62	1697 - 1838
6	412 - 446	20	1331 - 1441	36	1651 - 1789	64	1699 - 1841
7	509 - 550	21	1392 - 1508	38	1656 - 1794	66	1702 - 1843
8	599 - 649	22	1440 - 1560	40	1661 - 1799	68	1704 - 1846
9	690 - 748	23	1478 - 1602	42	1666 - 1804	70	1706 - 1849
10	777 - 841	24	1517 - 1643	44	1670 - 1810	72	1709 - 1851
11	852 - 922	25	1546 - 1674	46	1675 - 1815	74	1711 - 1854
12	919 - 995	26	1565 - 1695	48	1680 - 1820	76	1714 - 1856
13	976 - 1058	27	1584 - 1716	50	1682 - 1823	78	1716 - 1859
14	1029 - 1115	28	1603 - 1737	52	1685 - 1825	80	1718 - 1862

СХЕМА СЕЛЕКЦИИ



ЖИВАЯ МАССА, ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА

ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК несушки

Развитие живой массы при стандартной программе выращивания

Возраст нед.	Живая масса (г)			кДж** нес./день	Потребление корма		Корм*
	средняя	диапазон			г/нес./день	нараст. итогом	
1	75	72	78	120	10	70	ростовой
2	125	120	130	204	17	189	
3	187	180	194	276	23	350	
4	257	247	267	331	29	553	
5	337	324	350	388	34	791	
6	429	412	446	422	37	1050	
7	529	509	550	467	41	1337	
8	624	599	649	513	45	1652	
9	719	690	748	559	49	1995	
10	809	777	841	604	53	2366	развития
11	887	852	922	638	56	2758	
12	957	919	995	684	60	3178	
13	1017	976	1058	730	64	3626	
14	1072	1029	1115	764	67	4095	
15	1122	1077	1167	798	70	4585	
16	1167	1120	1214	832	73	5096	
17	1214	1166	1262	866	76	5628	
18	1264	1213	1315	901	79	6181	
19	1322	1269	1375	958	84	6769	
20	1386	1331	1441	1021	88	7385	начало яйцекладки

LSL 204

* Указанием для перехода от одного рациона к другому служит достижение молодками стандартной живой массы. Не возраст, а живая масса определяет смену рациона.

Обязательно неоднократно проводить взвешивание цыплят и молодок.

** 1 ккал = 4.187 кДж

После увеличения продолжительности светового периода птиц всегда кормить вволю. Отклонения возможны из-за различий в составе корма и в окружающей среде.

КОРМЛЕНИЕ

Общие положения

Максимальное использование генетической потенциальной продуктивности несушек ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК достигается только полноценным кормлением. Такое кормление можно обеспечить при использовании комбикорма, адаптированного к потенциальной продуктивности. В наших рекомендациях приведены уровни основных питательных веществ для каждой стадии развития.

Потребление корма

На потребление корма влияют:

- Живая масса
- Продуктивность (яйцемасса)
- Температура в птичнике
При низкой температуре увеличивается потребность в питательных веществах на поддержание жизни.
- Оперение
Плохое оперение из-за ошибок в содержании и кормлении птицы.
- Структура корма
Потребление корма при слишком грубом корме увеличивается, а при слишком мелком снижается.
- Уровень энергии
Чем выше содержание энергии, тем ниже потребление корма и наоборот.
- Несоответствие содержания питательных веществ
Дефицит любого питательного вещества курица старается компенсировать через увеличение потребления корма.

Кормление и масса яйца

При регулировании рационов масса яйца в определенных пределах может быть адаптирована к специфическим требованиям фермы.

Для этого следует соблюдать следующие факторы:

- Выращивание
Кормление для получения высокой живой массы в самом начале яйцекладки увеличивает массу яйца в течение всего яйценоского периода.
- Состав рациона
сырой протеин и метионин, линолевая кислота: высокое содержание увеличивает при соответствующем выборе энергии массу яйца.
- Техника кормления
структура корма, время кормления, уровень корма в кормушке, контролируемое кормление, частота кормления. При стимулировании потребления корма масса яйца может быть увеличена, при контролируемом кормлении - ограничена.

Для получения рекомендаций по кормлению и содержанию птицы свяжитесь со специалистами фирмы Ломанн Тирцухт.

Период выращивания

Обеспечение питательными веществами в период выращивания согласно потребности является необходимым условием для развития цыпленка в половозрелую молодку. Цыплята и молодки должны получать мучнистый корм крупного помола. Чрезмерное содержание очень мелких ингредиентов или слишком крупная структура ведут к выборочному потреблению корма и неравномерному обеспечению питательными веществами. Слишком мелкая структура корма снижает потребление корма птицы и может привести к недополучению ею отдельных питательных веществ. Если по гигиеническим соображениям нельзя отказаться от гранулирования корма, то тогда корм необходимо раздробить до рекомендуемой структуры.

Рекомендуемое распределение размера зерен в корме мучной формы: стартовом, ростовом, для молодок и для несушек

размер сита (мм)	проходящая часть %	интервал сита (мм)	часть в интервале %
0,5 мм	19	0 - 0,5 мм	19
1,0 мм	40	0,51 - 1 мм	21
1,5 мм	75	1,01 - 1,5 мм	35
2,0 мм	90	1,51 - 2 мм	15
2,5 мм	100	> 2 мм	10*
			100

* отдельные частицы не более

- 3 мм в стартовом корме и в корме для цыплят
- 5 мм в корме для молодок и в корме для несушек

На различных фазах роста цыплят и молодок надо использовать различные по качеству сорта корма, различающихся по составу питательных веществ по потребностям. Использование стартового корма рекомендуется тогда, когда стандартная живая масса не достигается через кормление кормом для цыплят или предполагается низкое дневное потребление корма. Переход на корм для молодок проводить если живая масса соответствует стандарту. Сокращенная на этой фазе плотность питательных веществ оказывает положительный эффект на развитие интенсивности потребления корма. Рацион предкладкой обладает по сравнению с кормом для молодок примерно двойным содержанием кальция, а также высоким содержанием протеина и аминокислот. При этом настоятельно требуется его использование прим. 14 дней до запланированного начала яйцекладки. Этот корм улучшает однородность стада: позволяет раносозревшей птице получить достаточно кальция для формирования скорлупы первых яиц и поздносозревшей птице дает лучшее обеспечение питательными веществами.

ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК несушки

Рекомендации по уровню питательных веществ в рационе (выращивание и начало яйцекладки)

Рацион*		стартовый**	ростовой	развития	предкладкой	начало яйцекл.
Питательные в-ва		1-3 нед.	1-8 нед.	9-16 нед.	17 нед. до 5% прод-ти	5% прод-ти ~ 28 нед.
Обменная энергия	ккал	2900	2750 - 2800	2750 - 2800	2750 - 2800	2800
минимум	МДж	12.0	11.4	11.4	11.4	11.6
Сырой протеин	%	21.0	18.5	14.5	17.5	18.0
Метионин	%	0.48	0.40	0.34	0.36	0.40
Усв. метионин	%	0.39	0.33	0.28	0.29	0.33
Метионин/цистин	%	0.83	0.70	0.60	0.68	0.73
Усв. М/Ц	%	0.68	0.57	0.50	0.56	0.60
Лизин	%	1.20	1.00	0.65	0.85	0.83
Усв. лизин	%	0.98	0.82	0.53	0.70	0.68
Валин	%	0.89	0.75	0.53	0.64	0.67
Усв. валин	%	0.76	0.64	0.46	0.55	0.58
Триптофан	%	0.23	0.21	0.16	0.20	0.20
Усв. триптофан	%	0.19	0.17	0.13	0.16	0.16
Треонин	%	0.80	0.70	0.50	0.60	0.59
Усв. треонин	%	0.65	0.57	0.40	0.49	0.48
Изолейцин	%	0.83	0.75	0.60	0.74	0.66
Усв. изолейцин	%	0.68	0.62	0.50	0.61	0.55
Кальций	%	1.05	1.00	0.90	2.00	3.70
Общий фосфор	%	0.75	0.70	0.58	0.65	0.60
Дост. фосфор	%	0.48	0.45	0.37	0.45	0.45
Натрий	%	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16
Хлорид, мин.	%	0.20	0.19	0.16	0.16	0.16
Линолевая к-та	%	2.00	1.40	1.00	1.00	2.00

LSL 1007

* Указанием для перехода от ростового к молодняковому рациону служит достижение молодками стандартной живой массы. Не возраст, а живая масса определяет время смены рациона. Обязательно неоднократно проводить взвешивание цыплят и молодок.

** Стартовый корм требуется в том случае, если кормом для цыплят стандарт живой массы не достигается или предполагается низкое дневное потребление корма.

Яйценоский период

Рацион для начала яйцекладки -это богатый энергией и питательными веществами корм с крупнозернистой структурой с содержанием кальция 3.7%. Данный рацион предназначен для периода возрастающей яйценоскости и используется до достижения пика яйценоскости (прим. до 28 нед. возраста). В это время все несушки здорового поголовья приступают к яйцекладке. Зесь как раз самое время перейти к фазовой программе кормления, при которой дневное количество яйцемассы на несушку, а также потребление ею корма, служат основой для расчета содержания питательных веществ в корме.

Корм 1 фазы удовлетворяет потребности для максимальной яйцемассы (более 58 г дневная яйцемасса на несушку). Он подобен рациону для начала яйцекладки, однако с более высоким содержанием кальция.

Цифры, приведенные в таблицах (фазы 1-3), предполагают уровень обменной энергии 11,4 мДж (2720 ккал), температуру окружающей среды 22° С и хорошее оперение птицы.

При таких условиях можно у ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК ожидать среднесуточное потребление корма между 105 - 115 г/день. При фазах 2 - 3 корм соответствует пониженной потребности в органических питательных веществах, а также повышенной потребности несушек в кальции с увеличением возраста. **Момент перехода к другому рациону определяется яйценоскостью и потребностью в кальции, а не возрастом!**

Во время яйценоского периода нужно в 10-недельный ритме приводить в соответствие состав корма к развитию яйценоскости несушек и потребности в питательных веществах. Необходимо избегать существенных изменений состава сырьевых компонентов в кормах различных фаз, а также явного изменения структуры корма.

Кормовые добавки

Кормовые добавки обеспечивают поставку основных витаминов, микроэлементов и таких веществ как антиоксиданты или каротиноиды (цвет желтка).

Необходимые кормовые добавки могут компенсировать колебания по основным компонентам и гарантировать полноценное питание.

Рекомендуемые уровни питательных веществ на кг корма для различного ежедневного потребления корма

Фаза 1 (прибл. от 29 до 45 нед. \approx более 58,6 г яйцемасса/несушка/день)

Питательные вещества	Потребность г/нес./ день	Дневное потребление корма			
		105 г	110 г	115 г	120 г
Сырой протеин	% 18.50	17.62 %	16.82 %	16.09 %	15.42 %
Кальций	% 4.10	3.90 %	3.73 %	3.57 %	3.42 %
Общий фосфор*	% 0.60	0.57 %	0.55 %	0.52 %	0.50 %
Дост. фосфор	% 0.42	0.40 %	0.38 %	0.37 %	0.35 %
Натрий	% 0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Хлорид	% 0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Лизин	% 0.87	0.83 %	0.79 %	0.76 %	0.73 %
Усв. лизин	% 0.71	0.68 %	0.65 %	0.62 %	0.59 %
Метионин	% 0.44	0.42 %	0.40 %	0.38 %	0.37 %
Усв. метионин	% 0.36	0.34 %	0.33 %	0.31 %	0.30 %
Метионин/цистин	% 0.80	0.76 %	0.73 %	0.70 %	0.67 %
Усв. М/Ц	% 0.66	0.63 %	0.60 %	0.57 %	0.55 %
Валин	% 0.69	0.66 %	0.63 %	0.60 %	0.58 %
Усв. валин	% 0.59	0.56 %	0.54 %	0.51 %	0.49 %
Триптофан	% 0.21	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.18 %
Усв. триптофан	% 0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Треонин	% 0.64	0.61 %	0.58 %	0.56 %	0.53 %
Усв. треонин	% 0.52	0.50 %	0.47 %	0.45 %	0.43 %
Изолейцин	% 0.66	0.63 %	0.60 %	0.57 %	0.55 %
Усв. изолейцин	% 0.55	0.52 %	0.50 %	0.48 %	0.46 %
Линолевая к-та	% 2.00	1.90 %	1.82 %	1.74 %	1.67 %

LSL 1007

* без фитазы

Фаза 2 (прибл. от 46 до 65 нед. \approx более 57,0 г яйцемасса/несушка/день)

Питательные вещества	Потребность г/нес./ день	Дневное потребление корма				
		105 г	110 г	115 г	120 г	
Сырой протеин	%	18.00	17.14 %	16.36 %	15.65 %	15.00 %
Кальций	%	4.40	4.19 %	4.00 %	3.83 %	3.67 %
Общий фосфор*	%	0.56	0.53 %	0.51 %	0.49 %	0.47 %
Дост. фосфор	%	0.40	0.38 %	0.36 %	0.35 %	0.33 %
Натрий	%	0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Хлорид	%	0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Лизин	%	0.83	0.79 %	0.75 %	0.72 %	0.69 %
Усв. лизин	%	0.68	0.65 %	0.62 %	0.59 %	0.57 %
Метионин	%	0.40	0.38 %	0.36 %	0.35 %	0.33 %
Усв. метионин	%	0.33	0.31 %	0.30 %	0.29 %	0.27 %
Метионин/цистин	%	0.74	0.70 %	0.67 %	0.64 %	0.62 %
Усв. М/Ц	%	0.61	0.58 %	0.55 %	0.53 %	0.51 %
Валин	%	0.68	0.65 %	0.62 %	0.59 %	0.57 %
Усв. валин	%	0.58	0.56 %	0.53 %	0.51 %	0.49 %
Триптофан	%	0.20	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.17 %
Усв. триптофан	%	0.16	0.15 %	0.15 %	0.14 %	0.14 %
Треонин	%	0.58	0.55 %	0.53 %	0.50 %	0.48 %
Усв. треонин	%	0.47	0.45 %	0.43 %	0.41 %	0.39 %
Изолейцин	%	0.65	0.62 %	0.59 %	0.57 %	0.54 %
Усв. изолейцин	%	0.54	0.51 %	0.49 %	0.47 %	0.45 %
Линолевая к-та	%	1.50	1.43 %	1.36 %	1.30 %	1.25 %

* без фитазы

LSL 1007

Фаза 3 (прибл. после 65 нед.)

Питательные вещества	Потребность г/нес./ день	Дневное потребление корма			
		105 г	110 г	115 г	120 г
Сырой протеин	% 17.50	16.67 %	15.91 %	15.22 %	14.58 %
Кальций	% 4.50	4.29 %	4.09 %	3.91 %	3.75 %
Общий фосфор*	% 0.47	0.45 %	0.43 %	0.41 %	0.39 %
Дост. фосфор	% 0.35	0.33 %	0.32 %	0.30 %	0.29 %
Натрий	% 0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Хлорид	% 0.17	0.16 %	0.15 %	0.15 %	0.14 %
Лизин	% 0.78	0.74 %	0.71 %	0.68 %	0.65 %
Усв. лизин	% 0.64	0.61 %	0.58 %	0.56 %	0.53 %
Метионин	% 0.36	0.34 %	0.33 %	0.31 %	0.30 %
Усв. метионин	% 0.30	0.28 %	0.27 %	0.26 %	0.25 %
Метионин/цистин	% 0.67	0.64 %	0.61 %	0.58 %	0.56 %
Усв. М/Ц	% 0.55	0.52 %	0.50 %	0.48 %	0.46 %
Валин	% 0.64	0.61 %	0.58 %	0.56 %	0.53 %
Усв. валин	% 0.55	0.52 %	0.50 %	0.48 %	0.46 %
Триптофан	% 0.19	0.18 %	0.17 %	0.17 %	0.16 %
Усв. триптофан	% 0.15	0.15 %	0.14 %	0.13 %	0.13 %
Треонин	% 0.55	0.52 %	0.50 %	0.48 %	0.46 %
Усв. треонин	% 0.45	0.42 %	0.41 %	0.39 %	0.37 %
Изолейцин	% 0.61	0.58 %	0.55 %	0.53 %	0.51 %
Усв. изолейцин	% 0.51	0.48 %	0.46 %	0.44 %	0.42 %
Линолевая к-та	% 1.30	1.24 %	1.18 %	1.13 %	1.08 %

* без фитазы

LSL 1007

Мелкий и крупный известняк постоянно должны быть в наличии

Рекомендуемые уровни известняка в рационе для несушек

Тип рациона	мелкий известняк	крупный известняк*
начало яйцекладки	35 %	65 %
для несушек фаза 1	30 %	70 %
для несушек фаза 2	25 %	75 %
для несушек фаза 3/4	15 %	85 %

* может быть частично заменен на ракушечник

LSL 1203

Рекомендуемые добавки

Добавки на 1 кг корма	стартовый/стартовый/	для развития	пред-кладкой/для несушек
Витамин А м.е.	12000	12000	10000
Витамин Д ₃ м.е.	2000	2000	2500
Витамин Е мг	20 - 30*	20 - 30*	15 - 30*
Витамин К ₃ мг	3**	3**	3**
Витамин В ₁ мг	1	1	1
Витамин В ₂ мг	6	6	4
Витамин В ₆ мг	3	3	3
Витамин В ₁₂ мкг	15	15	15
Пантотеновая к-та мг	8	8	8
Никотиновая к-та мг	30	30	30
Фолиевая к-та мг	1.0	1.0	0.5
Биотин мкг	50	50	25
Холин мг	300	300	400
Антиоксиданты мг	100 - 150*	100 - 150*	100 - 150*
Коксидиостат	по потреб.	по потреб.	-
Марганец мг	100	100	100
Цинк мг	60	60	60
Железо мг	25	25	25
Медь мг	5	5	5
Кобальт мг	0.1	0.1	0.1
Йод мг	0.5	0.5	0.5
Селен мг	0.2	0.2	0.2

* зависимо от добавки жира

** в два раза выше при использовании экспандированного корма

LSL 1007

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ежедневный контроль

По крайней мере раз в день проверять:

- состояние здоровья птицы
- температуру в птичнике
- подачу корма и воды (тщательный контроль потребления корма и воды может дать ценную информацию для содержания стада)
- освещение
- падеж
- вентиляцию

При оценке состояния здоровья птицы не пользуйтесь только общим впечатлением и информацией о падеже - фиксируйте потребление корма и воды, а также состояние помета.

Подача воды

Для получения максимальной продуктивности чистая вода важна также как и хороший корм. Если используется местный источник для подачи воды, то регулярно проверять качество воды. Слишком высокое содержание солей в воде может вызвать постоянное ухудшение качества скорлупы.

Качество яйца

Несушки ЛОМАНН ЛСЛ - КЛАССИК производят яйцо отличного качества. Для сохранения этого качества необходимо соблюдать следующее:

- собирать яйцо минимум 1 раз в день
- укладывать яйцо острым концом вниз
- хранить яйцо при температуре 5 -10° С и относительной влажности 80-85 %

Хранение при более высокой температуре и меньшей влажности приводит к быстрой потере веса и ухудшает качество яйца, т.к. увеличивается газообмен.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЫПЛЯТ

Перед поступлением цыплят

1. Прежде чем высадить цыплят, проверьте все ли находится в хорошем рабочем состоянии.
2. Прогрейте птичник в течение необходимого времени до 35-36° С (см. таб. на стр. 18). Летом начинайте обогрев птичника за 24, а зимой - за 48 часов до поступления цыплят.
3. Распределите корм и воду в птичнике: по возможности сначала воду, а после размещения цыплят - корм. В момент поступления цыплят вода должна быть комнатной температуры.
4. При клеточном выращивании отрегулируйте пол клеток и решетки согласно инструкции завода-изготовителя.

При поступлении цыплят

1. Разгрузите и распределите коробки в птичнике - **не более 2-3 коробок одна на другую**. Отодвиньте крышки и положите их свободно на верх коробок.
2. Быстро расположите цыплят около кормушек и поилок. При клеточном содержании распределите цыплят равномерно по клеткам, начиная с дальнего конца птичника.
3. После распределения еще раз проверьте рабочее состояние оборудования и температуру.
4. Спустя несколько часов проверьте, хорошо ли устроились цыплята. Поведение цыплят - самый хороший показатель их самочувствия:
 - Цыплята ровно распределены и свободно двигаются = температура и вентиляция нормальные.
 - Цыплята сбиваются в кучу или избегают каких-либо участков в помещении = температура слишком низкая или есть сквозняки.
 - Цыплята лежат на полу, раскинув крылья и хватая клювом воздух = температура слишком высокая.
5. Световой режим (см. график на стр. 19).

При первом признаке плохого самочувствия цыплят, выясните причину и чаще их проверяйте.

НАПОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Птица, которую в продуктивный период содержат на полу, должна быть также выращенной при напольном содержании. Соблюдайте меры предосторожности против возникновения вспышек кокцидиоза в продуктивный период, планируя условия для выращивания таким образом, чтобы иммунитет против кокцидиоза сохранялся в течение продуктивного периода.

Плотность посадки

Оптимальная плотность посадки птицы на м² зависит от условий содержания и от степени контролирования климата. Общая рекомендация содержания 6-8 несушек на 1 м². Придерживаться имеющихся местных рекомендаций и контролировать влияние плотности посадки на вес яйца и качество его скорлупы!

Гравий

Дача гравия (крупнозернистого песка) не обязательна, но рекомендуется при добавлении в рацион зерна.

Нормативы	
Недели 1 - 2	один раз в неделю 1 г/нес. (размер 1 - 2 мм)
Недели 3 - 8	один раз в неделю 2 г/нес. (размер 3 - 4 мм)
С 9 недели	один раз в месяц 3 г/нес. (размер 4 - 6 мм)

Подстилка

Хорошей подстилкой являются опилки мягкой древесины или солома. Используйте только опилки необработанного дерева во избежание отравления и накопления остаточных веществ в яйце. Обеспечьте достаточную вентиляцию для того, чтобы подстилка была рыхлой, влажную подстилку удаляйте.

Гнездо и сбор яйца

На качество яйца также влияет состояние гнезда. Регулярно обновляйте подстилку в гнездах и содержите их в чистоте. Норма плотности посадки в индивидуальном гнезде - 4 курицы на гнездо. Часто собирайте напольные яйца, чтобы иметь, насколько это возможно, низкий процент их наличия. Для снижения числа яиц, снесенных на полу, такими же важными как достаточное количество гнезд или мест в гнездах семейного типа, являются следующие факторы:

- Чистая, сухая подстилка или мягкое гнездовое покрытие
- Легкий доступ
- Равномерное распределение гнезд в помещении
- Хорошая освещенность всего птичника
- Наличие в птичнике гнезд одного типа.

Для получения яйца высокого качества лучше иметь покатые гнезда с планчатым полом нежели с подстилкой или гнезда семейного типа.

Оборудование для выращивания

	Возраст в нед.	
Поилка для цыплят	1	1 поилка (4 - 5 л) на 100 голов
Круглые поилки	до 20	1 поилка (Ø 46 см) на 125 голов
Линейные поилки	до 20	1 пог.м. на 100 голов
Капельные поилки	до 20	6-8 голов на ниппель
Кормушка для цыплят	1 - 2	1 кормушка на 60 голов
Обрезная картонная тара	1- 2	1 кормушка на 100 голов
Круглые кормушки	3-10	2 кормушки (Ø 40 см) на 100 голов
	11-20	3 кормушки (Ø 40 см) на 100 голов
Кормовой транспортер	3-10	2,5 - 3,5 пог. м на 100 голов
	11 -20	4,5 пог. м на 100 голов*

Оборудование для продуктивного периода

Круглые поилки	1 поилка (Ø 46 см) на 125 голов
Линейные поилки	1 пог. м на 80 - 100 голов
Капельные поилки	4-6 голов на ниппель
Круглые кормушки	4 кормушки (Ø 40 см) на 100 голов
Индивидуальное гнездо	1 гнездо (26 x 30 см) на 4 головы
Кормовой транспортер	5 пог. м на 100 голов*

* доступ с обеих сторон. При подходе к кормушке с одной стороны необходимо удвоить.

МИКРОКЛИМАТ ПТИЧНИКА

Условия окружающей среды влияют на самочувствие и продуктивность птиц. Важными факторами являются: температура, влажность и уровень содержания вредных газов в воздухе. Оптимальная температура на уровне птицы зависит от ее возраста. В следующей таблице указаны рекомендации по температуре в зависимости от возраста птицы. Поведение птицы - лучший показатель оптимальной температуры!

Снижение температуры проводите всегда постепенно и избегайте внезапных ее изменений.

Самая благоприятная температура для оптимальной конверсии корма в продуктивный период 22° - 24° С.

Если для регулировки температуры используется вентиляционная система, то внимательно следите за подачей свежего воздуха.

Возраст	Температура °С	Возраст	Температура °С
день 1 - 2*	36-35	3 недели	27-26
день 3 - 4	34-33	4 недели	24-22
день 5 - 7	32-31	5 недель	20-18
2 недели	29-28	6 недель	18-20

* Оптимальная температура тела для цыплят 40-41 °С

Качество воздуха должно отвечать следующим минимальным требованиям:

O ₂	свыше	16 %	NH ₃	ниже	20 ppm*
CO ₂	ниже	0,3 %	H ₂ S	ниже	5 ppm*
CO	ниже	40 ppm*			

* одна миллионная часть

Внутри помещения относительная влажность воздуха должна составлять 60 - 70 %.

ОСВЕЩЕНИЕ

Световой режим контролирует начало яйцекладки и влияет на продуктивность в течение всего яйценосного периода. Регулируя освещение можно в определенной степени приспособить продуктивность к специфическим требованиям фермы.

В закрытых помещениях легче соблюдать световые режимы. В таких условиях можно регулировать продолжительность светового периода и интенсивность освещения в зависимости от меняющихся потребностей.

Следует всячески избегать перевода птицы в закрытое помещение после выращивания ее в птичнике с окнами. Внезапное ухудшение интенсивности освещения может вызвать снижение продуктивности.

Выращивание птицы в птичнике без окон и дальнейший перевод ее в открытый птичник на продуктивный период допустим, но при этом надо соблюдать особую осторожность. Трудно

контролировать начало яйцекладки, если период естественного дневного освещения был продолжительным, а освещенность - высокой. Более того, перевод птицы в птичник с более высокой освещенностью может вызвать у нее повышенную нервозность. Полезно в период выращивания не проводить значительного понижения интенсивности света и продолжительности светового периода и перевод из одного птичника в другой осуществлять как можно позже.

Прерывистый световой режим для суточных цыплят


Ко времени рассадки на фермах выращивания у суточных цыплят уже позади как требующий сил вывод, так и утомительная транспортировка. Обычно в первые два-три дня после прибытия суточным цыплятам предоставляется свет в течение 24 часов, чтобы дать им время для восстановления сил и потребления достаточного количества корма и воды.

На практике однако наблюдается, что отдельные цыплята после прибытия отдыхают, другие ищут корм и воду. Поведение стада всегда разное. Особенно на этой фазе выращивания сложно дать правильную оценку поведения и состояния цыплят.

Специально для этого временного периода разработанный и уже опробованный на практике световой режим делит день на фазы отдыха и активности. С его помощью персоналу легче оценить состояние стада. Одновременно с этим цыплята стимулируются принимать достаточно корма и воды.

После поступления цыплят на ферму выращивания рекомендуется предоставить им короткую паузу отдыха, а затем начать с периодическим освещением - 4 часа свет затем 2 часа темно.

Световой режим после поступления цыплят



4 часа свет
2 часа темно
4 часа свет
2 часа темно
4 часа свет
2 часа темно
4 часа свет
2 часа темно
4 часа свет
2 часа темно
4 часа свет
2 часа темно

Данная программа может быть использована до 7-го или 10-го дня после прибытия цыплят. Затем нужно перейти к регулярной программе с постепенным уменьшением длины светового дня.

Использование данной программы имеет следующие преимущества:

- Цыплята отдыхают или спят одновременно. Поведение цыплят синхронизированно.
- Слабые цыплята стимулируются сильными быть активными в приеме корма и воды.
- Поведение стада уравновешенней, проще оценка цыплят.
- Потери цыплят в первую неделю жизни ниже.

Световой режим для птичников без окон

Основные принципы светового режима для несушек в птичниках без окон:

- никогда не увеличивайте продолжительность светового цикла в период выращивания птицы
- никогда не уменьшайте продолжительность светового цикла в продуктивный период

Средствами, с помощью которых можно приспособить продуктивность к специфическим требованиям фермы являются: степень снижения продолжительности светового цикла в период выращивания и время начала стимулирования путем увеличения продолжительности светового периода.

По требованию разрабатываются программы по прерывистому освещению.

Световой режим для птичников без окон (пример) ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК

неделя жизни	Освещение в часах	Интенсивность освещения	
	стандарт	В/м ²	люкс**
день 1 - 2	24	3 - 4	20 - 40
день 3 - 6	16	2	20 - 30
2	14	2	10 - 20
3	13	1	4 - 6***
4	12	1	4 - 6
5	11	1	4 - 6
6	10	1	4 - 6
7	9	1	4 - 6
8	8	1	4 - 6
9	8	1	4 - 6
10	8	1	4 - 6
11	8	1	4 - 6
12	8	1	4 - 6
13	8	1	4 - 6
14	8	1	4 - 6
15	8	1	4 - 6
16	8	1	4 - 6
17	8	1	4 - 6
18	8	3	10 - 15****
19	9	3	10 - 15
20	10	3	10 - 15
21	11	3	10 - 15
22	12	3	10 - 15
23	13	3	10 - 15
24	14	3	10 - 15
25*	14	3	10 - 15

* до конца продуктивного периода

** ориентировочные значения. Интенсивность освещения должна соответствовать развитию стада.

*** на 3-4 неделе снижение интенсивности с максимальной до минимально возможной

**** в производственный период выше чем в период выращивания

Световой режим для птичников с окнами

В случае, если естественный свет имеет доступ в птичник или используются свободно доступные выгулы, то тогда, работая над световым режимом, необходимо учитывать влияние естественного светового дня. При этом нужно иметь в виду, что при средневропейской географической широте (также для России) длина светового дня в течение календарного года увеличивается до 17 часов к концу июня, затем опять уменьшается и к концу декабря составляет прим. 8 часов.

Для птичников без окон действительно: "во время периода выращивания не увеличивать продолжительность светового цикла и во время продуктивного периода - не уменьшать", это положение действительно также для "открытых" птичников, однако при этом обязательно должна быть учтена длина естественного светового дня.

При переводе птиц в производственные помещения, окна которых не могут быть затемнены или свет (так называемый "чужой свет") может проникнуть через шахты притока или оттока воздуха, или временами используются свободно доступные выгулы, то тогда ко времени перевода световой режим должен соответствовать длине естественного светового дня. Имеют место два различных варианта:

1. Начало производства при уменьшающейся длине естественного светового дня
2. Начало производства при увеличивающейся длине естественного светового дня

В зависимости от длины естественного светового дня на 17-ой неделе жизни, как в варианте 1 так и в 2, световой режим устанавливается как минимум 10 часов и каждую неделю увеличивается на один час до 14 часов к 21- неделе жизни. Искусственное освещение никогда нельзя включать до 04.00 часов (средневропейское летнее время). В весенние месяцы световой режим подвержен влиянию увеличения длины естественного светового дня и световой цикл постепенно растет до прим. 17 часов. С июля, с уменьшением длины светового дня, необходимо до конца продуктивного периода поддерживать 17 часов света. Очень просто это можно организовать следующим образом:

- 04.00* вкл. освещения - сумеречный переключатель при $\geq 50-60$ лк выключен
- при $\leq 50-60$ лк сумеречный переключатель включен - в 21.00* освещение выключено

* средневропейское летнее время

Данные указания могут и должны варьироваться в зависимости от состояния стада, начала яйцекладки (производство, размер яйца) и оборудования птичника. Если из-за условий работы или экономии устанавливается другой режим нежели приведенный выше, то тогда, принимая во внимание суточный ритм несушек, световой режим должен незначительно отклоняться от вышеуказанного начала или конца светового дня.

Если птицу перед окончанием светового дня загоняют в птичник и имеется возможность птичник полностью затемнить, то тогда применяется световой режим для птичников без окон.

Время затемнения или открытия окон должен соответствовать световому режиму. При этом следует обратить внимание на то, что сначала нужно закрыть окна и затем выключить освещение или же утром сначала включить свет и затем открыть окна.

Специалисты фирмы Ломанн Тирцухт ГмБХ помогут вам в составлении соответствующего светового режима для стада с учетом племенного продукта, времени вывода и географического местоположения предприятия.

ГИГИЕНА

Общие рекомендации

1. Ферма должна находиться в как можно более изолированном месте и должна быть огорожена.
2. На ферме содержите птицу только одной возрастной группы.
3. Нельзя содержать в хозяйстве никаких других видов сельскохозяйственной птицы.
4. Посторонних на ферму по возможности не впускать.
5. На ферме носить спецодежду, предназначенную только для данной фермы.
6. Обеспечить защитной одеждой ветеринаров, рабочих по обслуживанию птицы и консультантов.
7. Прежде, чем войти в птичник, продезинфицировать обувь.
8. По возможности для поставки корма использовать только специальные кормовозы. Водителям грузового транспорта входить в птичник не разрешается.
9. Не допускать проникновение в птичник дикой и хищной птицы. Под постоянным контролем держать наличие крыс и мышей.
10. Избавляться от павшей птицы с соблюдением правил гигиены. Следовать местным законам и правилам.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Несушки ЛОМАНН ЛСЛ - КЛАССИК

Возраст	Число яиц на НН	Интенсивность яйцекладки в %		Масса яйца г		Яйцемасса г/СН кг/НН	
	нараст.	на НН	на СН	в неделю	нараст.	в неделю	нараст.
20	1.0	15.0	15.0	42.7	42.7	6.4	0.04
21	4.3	47.0	47.0	46.6	45.7	21.9	0.20
22	9.2	69.0	69.1	49.1	47.5	33.9	0.44
23	14.8	81.0	81.2	52.1	49.2	42.3	0.73
24	20.9	87.0	87.3	54.2	50.7	47.3	1.06
25	27.3	90.5	91.0	56.0	51.9	51.0	1.42
26	33.7	92.5	93.1	57.5	53.0	53.5	1.79
27	40.3	93.5	94.2	58.4	53.9	55.0	2.17
28	46.9	93.8	94.6	59.1	54.6	55.9	2.56
29	53.4	93.9	94.8	59.6	55.2	56.5	2.95
30	60.0	94.0	95.0	60.0	55.8	57.0	3.35
31	66.6	94.1	95.1	60.4	56.2	57.5	3.74
32	73.2	94.0	95.1	60.8	56.6	57.9	4.14
33	79.7	93.9	95.1	61.2	57.0	58.2	4.55
34	86.3	93.8	95.1	61.6	57.4	58.6	4.95
35	92.9	93.7	95.1	61.9	57.7	58.9	5.36
36	99.4	93.5	95.0	62.2	58.0	59.1	5.76
37	106.0	93.3	94.9	62.5	58.3	59.3	6.17
38	112.5	93.1	94.8	62.7	58.5	59.4	6.58
39	119.0	92.9	94.7	62.9	58.7	59.6	6.99
40	125.5	92.7	94.6	63.1	59.0	59.7	7.40
41	131.9	92.5	94.5	63.2	59.2	59.7	7.81
42	138.4	92.3	94.4	63.3	59.4	59.7	8.22
43	144.8	92.0	94.2	63.4	59.6	59.7	8.63
44	151.3	91.7	94.0	63.5	59.7	59.7	9.03
45	157.7	91.4	93.7	63.6	59.9	59.6	9.44
46	164.0	91.1	93.5	63.7	60.0	59.6	9.85
47	170.4	90.8	93.3	63.8	60.2	59.5	10.25
48	176.7	90.5	93.1	63.9	60.3	59.5	10.66
49	183.0	90.1	92.8	64.0	60.4	59.4	11.06

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Несушки ЛОМАНН ЛСЛ - КЛАССИК

Возраст	Число яиц на НН	Интенсивность яйцекладки в %		Масса яйца г		Яйцемасса г/СН кг/НН	
	нараст.	на НН	на СН	в нед.	нараст.	в нед.	нараст.
50	189.3	89.7	92.5	64.1	60.6	59.3	11.46
51	195.6	89.3	92.2	64.2	60.7	59.2	11.86
52	201.8	88.9	91.8	64.3	60.8	59.1	12.26
53	208.0	88.5	91.5	64.4	60.9	58.9	12.66
54	214.1	88.0	91.1	64.5	61.0	58.8	13.06
55	220.3	87.5	90.7	64.6	61.1	58.6	13.46
56	226.3	87.0	90.2	64.7	61.2	58.4	13.85
57	232.4	86.5	89.8	64.8	61.3	58.2	14.24
58	238.4	86.0	89.4	64.9	61.4	58.0	14.63
59	244.4	85.5	89.0	65.0	61.5	57.8	15.02
60	250.4	84.9	88.4	65.1	61.5	57.6	15.41
61	256.3	84.3	87.9	65.2	61.6	57.3	15.79
62	262.1	83.7	87.4	65.3	61.7	57.1	16.18
63	267.9	83.1	86.8	65.4	61.8	56.8	16.56
64	273.7	82.5	86.3	65.5	61.9	56.5	16.93
65	279.4	81.8	85.7	65.6	61.9	56.2	17.31
66	285.1	81.1	85.0	65.7	62.0	55.9	17.68
67	290.7	80.4	84.4	65.8	62.1	55.5	18.05
68	296.3	79.7	83.7	65.9	62.2	55.2	18.42
69	301.8	79.0	83.1	66.0	62.2	54.8	18.79
70	307.3	78.2	82.3	66.1	62.3	54.4	19.15
71	312.7	77.4	81.6	66.2	62.4	54.0	19.51
72	318.1	76.6	80.8	66.3	62.4	53.6	19.86
73	323.4	75.8	80.0	66.4	62.5	53.1	20.21
74	328.7	75.0	79.3	66.5	62.6	52.7	20.56
75	333.8	74.2	78.5	66.6	62.6	52.3	20.91
76	339.0	73.3	77.6	66.7	62.7	51.8	21.25
77	344.0	72.4	76.8	66.8	62.8	51.3	21.59
78	349.0	71.5	75.9	66.9	62.8	50.8	21.93
79	354.0	70.6	75.0	67.0	62.9	50.3	22.26
80	358.9	69.7	74.1	67.1	62.9	49.8	22.58

LSL 901

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ ЯЙЦА


Ожидаемые весовые категории яиц (%)
в зависимости от средней массы яйца

Масса яйца (сред. по стаду)	XL	L	M	S
	более 73 г	63 – 72.9 г	53 – 62.9 г	ниже 53 г
46	0.0	0.0	1.5	98.5
47	0.0	0.0	3.4	96.6
48	0.0	0.0	6.8	93.2
49	0.0	0.0	12.2	87.8
50	0.0	0.0	19.6	80.4
51	0.0	0.0	28.7	71.2
52	0.0	0.1	39.1	60.8
53	0.0	0.4	49.6	50.0
54	0.0	0.9	59.6	39.6
55	0.0	1.9	67.9	30.2
56	0.0	3.7	74.1	22.2
57	0.0	6.6	77.6	15.8
58	0.0	10.9	78.2	10.9
59	0.0	16.6	76.0	7.3
60	0.1	23.7	71.5	4.8
61	0.2	31.7	65.0	3.0
62	0.6	40.3	57.2	1.9
63	1.2	48.8	48.8	1.2
64	2.2	56.6	40.5	0.7
65	3.9	63.1	32.6	0.4
66	6.5	67.7	25.6	0.2
67	10.0	70.3	19.6	0.1
68	14.7	70.6	14.6	0.1
69	20.4	68.9	10.7	0.0
70	27.0	65.3	7.6	0.0
неделя	Ожидаемое распределение яиц по весовым категориям			
70	2.1	45.9	45.8	6.2
72	2.2	46.6	45.1	6.0
74	2.4	47.3	44.4	5.8
76	2.6	48.0	43.7	5.7
78	2.8	48.6	43.1	5.5
80	3.0	49.2	42.5	5.4

LSL 901

КРИВАЯ ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Несушки ЛОМАНН ЛСЛ - КЛАССИК



LSL 1007

ДЕБИКИРОВАНИЕ

Обычно дебикирование проводить не обязательно. Но это эффективный способ предотвращения каннибализма и расклева перьев. Птица ведет себя подобным образом при соответствующих условиях окружающей среды, как например, в птичнике с окнами при очень ярком освещении.

В таких случаях рекомендуется дебикировать клюв, но проводить это надо при полном соблюдении требований.

Следующие рекомендации и меры предосторожности зарекомендовали себя на практике:

- Дебикировать только здоровую птицу, не подверженную стрессу.
- Дебикирование следует проводить в возрасте 7-10 дней.
- Доверяйте эту работу только опытным специалистам.

-
- Работать медленно и тщательно.
 - Для дебикирования используйте оборудование и лезвия в хорошем рабочем состоянии; температура лезвия должна быть такова, чтобы было обеспечено прижигание без повреждения клюва.
 - Не кормите птицу за 12 часов до дебикирования.
 - Сразу после дебикирования накормите птицу вволю.
 - Увеличьте содержание корма в кормушках.
 - После дебикирования на несколько дней повысите температуру в птичнике.
 - В течение 3-5 дней после дебикирования увеличьте продолжительность светового периода на 1 час, давайте птице корм поздно вечером или ночью.
 - Добавление витаминов в питьевую воду позволяет снизить стресс.

ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация является эффективным способом предотвращения болезней. Различные региональные эпидемиологические ситуации требуют адаптированные соответствующим образом программы вакцинации. Следуйте советам вашего местного ветеринара и службы по ветеринарному обслуживанию.

Методы вакцинации

Индивидуальная вакцинация - инъекции, закапывание в глаза и т.д. - очень эффективная и в большинстве своём хорошо переносимая, но при этом очень трудоемкая операция.

Вакцинация через питьевую воду не является столь трудоемкой, но требует величайшей осторожности. Вода, предназначенная для приготовления раствора вакцины, не должна содержать какие-либо дезсредства. В период выращивания, за 2 часа до проведения вакцинации, птицу следует держать без воды. Если погода жаркая, то период содержания птицы без воды следует соответственно сократить. Количество вакцины должно быть рассчитано на потребление птицей в течение 2-4 часов. При использовании живой вакцины, для защиты титра вируса, добавьте в раствор сухое молоко из расчета 2 г на 1 л воды.

Вакцинация аэрозольным методом нетрудоемка и высокоэффективна, но может иметь побочные эффекты. Для цыплят до 3-х недельного возраста - только грубодисперсные аэрозоли.

Примерное расписание вакцинаций несушек ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК

Заболевание	Распространение		Метод вакцинации	Примечания
	всемирное	локальное		
Марек	●		И	одноразовая вакцинация цыплят в инкубаторе
Кокцидиоз	●		В / К	
Ньюкасла	●		В / С / И	предусмотрена законом
Гамборо	●		В	
Инфекционный бронхит	●		В / С / И	
Энцефаломиелит	●		В	вакцинировать несушек и родительское стадо
Микоплазма галлисептикум		●	И	
Птичья оспа		●	ПП	
Пастереллез		●	И	
Кориза		●	И	
Сальмонелла	●		В / И	предусмотрена законом в стадах с более 250 молодок
ИЛТ		●	В / ЗГ	
ССЯ		●	И	
Колибациллез	●		И	

В питьевая вода

С спрэй

И инъекция

К корм

ЗГ зак. в глаза

ПП в перепонку крыла

Общие рекомендации

Только здоровая птица может быть вакцинирована. Проверьте срок действия вакцины. Не следует использовать вакцину срок годности которой истек. Регистрируйте все вакцинации и серийный номер вакцин.

Специальные рекомендации

Ревакцинация против болезни Марек - зарекомендовала себя эффективной после долгой транспортировки птицы и в областях с высоким инфекционным риском. Для дальнейшей информации проконсультируйтесь у вашего ветеринара или в лаборатории фирмы Ломанн.

Вакцинация против микоплазмоза - целесообразна когда не имеется возможности держать ферму свободной от микоплазмоза. Заражение вирулентной микоплазмой в продуктивный период может привести к снижению продуктивности. Наивысшую продуктивность можно получить когда стадо не заражено микоплазмозом и не подвержено вакцинации.

Применение витаминов в первые 2-3 дня после вакцинации может помочь снизить стресс и предотвратить нежелательные реакции. Необходимость этого зависит от специфической ситуации на каждой отдельной ферме.

**Как Ломанн Тирцухт рассчитывает содержание энергии в корме
и в сырьевых компонентах (международная WPSA – формула):**

$$\begin{aligned} \text{ОЭ мДж/кг} = & \quad \text{г сырой протеин} \quad \times 0,01551 \\ & + \quad \text{г сырой жир} \quad \quad \times 0,03431 \\ & + \quad \text{г сырой крахмал} \times 0,01669 \\ & + \quad \text{г сахар} \quad \quad \quad \times 0,01301 \quad (\text{как сахароза}) \end{aligned}$$

ОЭ = обменная энергия в мДж/кг

$$1 \text{ ккал} = 4,187 \text{ кДж}$$

Консультации по всем вопросам здоровья птицы и диагностика:

LOHMANN TIERZUCHT GmbH
Veterinary Laboratory

Abschnede 64, 27472 Cuxhaven • P.O.Box 446, 27454 Cuxhaven, Germany
Тел.: +49 4721 7070 • факс: +49 4721 63439 • e-mail: info@ltz.de

Названные в данном руководстве данные продуктивности основаны на клеточном содержании обычной формы. Другие системы содержания и неблагоприятные условия окружающей среды, кормления и обслуживания могут привести к существенным отклонениям показателей продуктивности.



LOHMANN
T I E R Z U C H T

LOHMANN TIERZUCHT GMBH
P.O.Box 460 • 27454 Cuxhaven • Germany
Phone + 49 4721/ 50 50 • Fax + 49 4721/ 3 88 52
e-mail info@ltz.de • www.ltz.de